

Criterios ASAS de SpA axial

En pacientes con lumbalgia ≥ 3 meses, edad de comienzo ≤ 45 años

Sacroilitis en imagen * + ≥ 1 hallazgo de SpA**	HLA-B27 + \geq otros 2 hallazgos SpA**
<p>** Hallazgos de SpA:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dolor lumbar inflamatorio •Artritis •Entesitis tobillo •Uveítis •Dactilitis •Psoriasis •EII •Buena respuesta a AINE •Historia familiar SpA •HLA-B27 •Elevación PCR 	<p>* Sacroilitis en imagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Inflamación aguda en RM ↑sugestiva de sacroilitis asociada con SpA <li style="text-align: center;">ó •Sacroilitis radiológica definida según criterios de NY modificados <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Sensibilidad: 82,9%, especificidad 84,4% Brazo imagen solo: S 66,2%, E 97,3%</p> </div>

Hallazgo SpA	Definición
Dolor lumbar inflamatorio	4 de 5: comienzo < 40 a; comienzo insidioso; mejoría con ejercicio; no mejoría con reposo; dolor nocturno que mejora al levantarse
Artritis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Entesitis	Pasado o presente, dolor espontaneo o a la presión en inserción calcánea de T Aquiles o de fascia plantar
Uveítis	Pasada o presente, uveítis anterior diagnosticada por oftalmólogo
Dactilitis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Psoriasis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
EII	Pasada o presente, diagnosticada por un médico

Hallazgo SpA	Definición
Buena respue. AINE	Desaparición o mejoría importante del dolor lumbar tras 24-48h de dosis plenas de AINE
Historia familiar SpA	Presencia en familiares de 1º y 2º grado de: EA, psoriasis, uveítis aguda, EII, ARe
Elevación PCR	↑ PCR en presencia de dolor lumbar, sin otras causas que justifiquen su elevación
HLA-B27	Test + con técnicas estándar
Sacroilitis RX	Bilateral grado 2-4, unilateral grado 3-4, según los criterios de NY modificados
Sacroilitis RM	Lesiones inflamatorias de sacroilíacas con edema óseo/osteitis sugestivas de sacroilitis asociada a SpA