

# Criterios de SpA de

*Amor y del Grupo Europeo de Estudio de  
Espondiloartropatías (ESSG)*

Amor	ESSG
SpA si reúne $\geq 6$ puntos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dolor inflamatorio espinal, ó</li><li>• Sinovitis asimétrica ó de predominio en MMII</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Sacroilitis según criterios NY (3 pts)</li></ul>	Y $\geq 1$ de los siguientes:
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dolor lumbar inflamatorio (1 pto)</li><li>• Dolor glúteo unilateral (1 pto)</li><li>• Dolor glúteo alternante (2 pts)</li><li>• Entesopatía (2 pts)</li><li>• Oligoartritis asimétrica (2 pts)</li><li>• Dactilitis (2 pts)</li><li>• Uveítis anterior (2 pts)</li><li>• HLA-B27 /Historia SpA (2 pts)</li><li>• Buena respuesta a AINE (2 pts)</li><li>• Psoriasis, balanitis, EII (2 pts)</li><li>• Diarrea, uretritis, cervicitis en mes previo (1 pto)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Historia familiar positiva</li><li>• Psoriasis</li><li>• EII</li><li>• Uretritis, Cervicitis, o diarrea en el mes anterior al inicio de la artritis</li><li>• Dolor glúteo alternante</li><li>• Entesopatía</li><li>• Sacroilitis</li></ul>