

# Criterios de Lumbalgia Inflamatoria

| Criterios de Calin  | Criterios de Berlín  | Criterios ASAS   |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comienzo &lt; 40 años</li> <li>2. Dolor lumbar &gt;3 mes</li> <li>3. Comienzo insidioso</li> <li>4. Rigidez matutina</li> <li>5. Mejoría con ejercicio</li> </ol> | <p>Lumbalgia &gt;3 meses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rigidez m. &gt;30 min</li> <li>2. Mejoría con ejercicio no con el reposo</li> <li>3. Dolor nocturno</li> <li>4. Dolor alternante nalgas</li> </ol> | <p>Lumbalgia &gt;3 meses:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comienzo &lt; 40 años</li> <li>2. Comienzo insidioso</li> <li>3. Mejoría con ejercicio</li> <li>4. No mejoría con reposo</li> <li>5. Dolor nocturno</li> </ol> |
| LI si $\geq 4$ de los 5   | LI si $\geq 2$ de los 4  | LI si $\geq 4$ de los 5  |
| <i>Calin.</i><br><i>JAMA 1977</i>   | <i>Rudwaleit.</i><br><i>Arthritis Rheum 2006</i>   | <i>Sieper.</i><br><i>Ann Rheum Dis 2009</i>  |