

Criterios ASAS de EspA axial

En pacientes con lumbalgia ≥ 3 meses, edad de comienzo ≤ 45 años

Sacroilitis en imagen * + ≥ 1 hallazgo de EspA**	HLA B27 + \geq otros 2 hallazgos EspA**
** Hallazgos de EspA: <ul style="list-style-type: none"> • Dolor lumbar inflamatorio • Artritis • Entesitis tobillo • Uveítis • Dactilitis • Psoriasis • EII • Buena respuesta a AINE • Historia familiar SpA • HLA B27 • Elevación PCR 	* Sacroilitis en imagen: <ul style="list-style-type: none"> • Inflamación aguda en RM ↑ sugestiva de sacroilitis asociada con EspA <li style="text-align: center;">ó • Sacroilitis radiológica definida según criterios de NY modificados <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Sensibilidad: 82,9%, especificidad 84,4% Brazo imagen solo: S 66,2%, E 97,3% </div>

Hallazgo EspA	Definición
Dolor lumbar inflamatorio	4 de 5: comienzo < 40 a; comienzo insidioso; mejoría con ejercicio; no mejoría con reposo; dolor nocturno que mejora al levantarse
Artritis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Entesitis	Pasado o presente, dolor espontaneo o a la presión en inserción calcánea de T Aquiles o de fascia plantar
Uveítis	Pasada o presente, uveítis anterior diagnosticada por oftalmólogo
Dactilitis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Psoriasis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
EII	Pasada o presente, diagnosticada por un médico

Hallazgo EspA	Definición
Respuesta a AINE	Desaparición o mejoría importante del dolor lumbar tras 24-48 h de dosis plenas de AINE
Historia familiar de EspA	Presencia en familiares de 1º y 2º grado de: EA, psoriasis, uveítis aguda, EII, ARe
Elevación PCR	↑ PCR en presencia de dolor lumbar, sin otras causas que justifiquen su elevación
HLA B27	Test + con técnicas estándar
Sacroilitis RX	Bilateral grado 2-4, unilateral grado 3-4, según los criterios de NY modificados
Sacroilitis RM	Lesiones inflamatorias de sacroilíacas con edema óseo/osteitis sugestivas de sacroilitis asociada a EspA