

# Criterios ASAS de EspA axial

En pacientes con lumbalgia  $\geq 3$  meses, edad de comienzo  $\leq 45$  años



**Sacroilitis en imagen \***  
+  
 **$\geq 1$  hallazgo de EspA \*\***



**HLA B27**  
+  
 **$\geq$  otros 2 hallazgos EspA \*\***

**\* Sacroilitis en imagen:**

- Inflamación aguda en RM sugestiva de sacroilitis asociada con EspA  
ó
- Sacroilitis radiológica definida según criterios de NY modificados

**\*\* Hallazgos de EspA:**

- Dolor lumbar inflamatorio
- Artritis
- Entesitis tobillo
- Uveítis
- Dactilitis
- Psoriasis
- EII
- Buena respuesta a AINE
- Historia familiar SpA
- HLA B27
- Elevación PCR

Sensibilidad: 82,9%; Especificidad: 84,4%

Brazo imagen solo: Sen: 66,2%; Esp: 97,3%

Hallazgo EspA	Definición
Dolor lumbar inflamatorio	4 de 5: comienzo < 40 a; comienzo insidioso; mejoría con ejercicio; no mejoría con reposo; dolor nocturno que mejora al levantarse
Artritis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Entesitis	Pasado o presente, dolor espontaneo o a la presión en inserción calcánea de T Aquiles o de fascia plantar
Uveítis	Pasada o presente, uveítis anterior diagnosticada por oftalmólogo
Dactilitis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
Psoriasis	Pasada o presente, diagnosticada por un médico
EII	Pasada o presente, diagnosticada por un médico

<b>Hallazgo EspA</b>	<b>Definición</b>
Respuesta a AINE	Desaparición o mejoría importante del dolor lumbar tras 24-48 h de dosis plenas de AINE
Historia familiar de EspA	Presencia en familiares de 1º y 2º grado de: EA, psoriasis, uveítis aguda, EII, ARe
Elevación PCR	Elevación de PCR en presencia de dolor lumbar, sin otras causas que lo justifiquen
HLA B27	Test + con técnicas estándar

<b>Sacroilitis en imagen</b>	<b>Definición</b>
Sacroilitis RX	Bilateral grado 2-4, unilateral grado 3-4, según los criterios de NY modificados
Sacroilitis RM	Lesiones inflamatorias de sacroilíacas con edema óseo/osteitis sugestivas de sacroilitis asociada a EspA

M Rudwaleit et al. Ann Rheum Dis. 2009 Jun;68(6):770-6.